

ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата

# ГелоМиртол®

GeloMyrtol®

Регистрационный номер: П N012303/01

**Торговое название препарата:** ГелоМиртол®

**Международное непатентованное название или группировочное название:** Миртол

**Лекарственная форма:**

капсулы кишечнорастворимые

**Состав:**

1 капсула препарата содержит:

Активное вещество:

Миртол стандартизированный 120 мг на минимальное содержание:

лимонена 30 мг

цинеола 30 мг

альфа-пинена 8 мг

Вспомогательные вещества :

Среднецепочечные триглицериды 120 мг, желатин около 120 мг, глицерол q.s., сорбитол q.s., хлористоводородная кислота 13 % q.s., кишечнорастворимая оболочка капсулы (производное гипромеллозы, эфир лимонной кислоты, органосульфат жирной кислоты, тальк, частично гидролизованный крахмал, производное глицирризиновой кислоты) около 50 мг

**Описание:**

Овальные мягкие полупрозрачные желатиновые капсулы. Содержимое капсул – маслянистая прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Отхаркивающее средство растительного происхождения. **КОД АТХ: R05C**

**Фармакологические свойства:**

Оказывает муколитическое, противовоспалительное, антибактериальное действие.

*Фармакокинетические свойства*

Хорошо всасывается в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–3 часа после приема препарата. Приблизительно 60 % препарата и его метаболитов выводится с мочой, 5 % – с калом, около 2 % – легкими. Может проникать через плацентарный барьер; в молоко кормящих женщин.

**Показания к применению:**

Применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (синуситы, острый и хронический бронхиты).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 1 триместр беременности, период лактации, детский возраст до 6 лет.

**Применение при беременности:**

В связи с отсутствием специальных исследований в период беременности (II-III триместр) следует применять с осторожностью по назначению врача при условии, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат принимают внутрь, у взрослых и детей старше 6 лет, за 30 минут до еды, запивая достаточным количеством воды комнатной температуры.

Детям от 6 до 10 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле 3–4 раза в день, при хроническом воспалении – по 1 капсуле 2–3 раза в день.

Детям от 10 до 18 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле 4–5 раз в день, при хроническом воспалении – по 1 капсуле 2–3 раза в день.

Взрослым назначают при остром воспалении по 2 капсулы 4–5 раз в день (8–10 капсул в сутки), при хроническом – по 2 капсулы 3 раза в день и, для облегчения отхождения мокроты утром, дополнительно принимают 2 капсулы перед сном (8 капсул в сутки).

Продолжительность лечения зависит от степени выраженности симптомов заболевания и определяется врачом.

### **Побочные действия:**

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, отек лица, спазм бронхов), одышка, тахикардия, сухость во рту, боли в желудке, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре.

Если после приема препарата проявляются побочные действия, не описанные в этой инструкции, то следует немедленно сообщить об этом врачу.

### **Передозировка:**

При случайной передозировке возможны тошнота, рвота, судороги, в тяжелых случаях – кома или нарушение дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Лечение: вазелиновое масло в количестве 3 мл на килограмм массы тела; промывание желудка 5% раствором бикарбоната натрия (питьевая сода); вентиляция легких кислородом.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

Не описано.

### **Форма выпуска:**

Капсулы кишечнорастворимые 120 мг. По 10 капсул в блистерную упаковку. По 2 блистерных упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку

### **Условия хранения:**

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

### **Срок годности:**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

### **Название и адрес изготовителя:**

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG  
Kieler Strasse 11  
25551 Hohenlockstedt (BRD)

Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ  
Килер штрассе 11  
25551 Хохенлокштедт (ФРГ)

Адрес для предъявления претензий:

ОАО «Красногорсклексредства»  
Россия, 143444, Московская обл.,  
г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, 25  
Тел.: (495) 705-93-80, Факс: (495) 705-93-82  
E-mail: krls@krls.ru  
<http://www.krls.ru>

POHL BOSKAMP 