



ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата

# ГелоМиртол® форте

Регистрационный номер: П N013662/01

Торговое название препарата: ГелоМиртол® форте

Международное непатентованное название или группировочное название: Миртол

Лекарственная форма: Капсулы кишечнорастворимые

**Состав:** капсула содержит:

**Активный компонент:**

Миртол стандартизированный 300 мг на минимальное содержание:

лимонена 75 мг

цинеола 75 мг

$\alpha$ -пинена 20 мг

**Вспомогательные вещества:**

Рапсовое масло

**Капсула:**

Желатин, глицерол 85 %, сорбитол, 13 % раствор кислоты хлористоводородной

**Вспомогательные компоненты оболочки капсулы:**

Гипромеллозы ацетата сукцинат, триэтилцитрат, натрия лаурилсульфат, тальк, декстрин, аммония глицирризинат.

**Описание:**

Мягкие желатиновые капсулы, прозрачные, продолговатой формы.

Содержимое капсул – прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ: R05C.**

**Фармакологические свойства:**

Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, муколитическое действие.

**Фармакокинетические свойства:**

Хорошо всасывается в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–3 часа после приема препарата. Приблизительно 60 % препарата и его метаболитов выводится с мочой, 5 % – с калом, около 2 % – легкими. Может проникать через плацентарный барьер; в молоко кормящих женщин.

**Показания к применению:**

Применяют в комплексной терапии при остром и хроническом бронхите, при воспалении придаточных пазух носа (синусит).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 1-ый триместр беременности, период лактации, детский возраст (до 10 лет).

**Применение при беременности:**

В связи с отсутствием специальных исследований, в период беременности (II–III триместр) препарат следует принимать с осторожностью по назначению врача при условии, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.





**Способ применения и дозы:**

Препарат принимают внутрь, у взрослых и детей старше 10 лет, за полчаса до еды, запивая достаточным количеством прохладной воды.

Взрослым назначают при остром воспалении по 1 капсуле 3–4 раза в день, при хроническом – по 1 капсуле 2 раза в день. Для облегчения отхождения мокроты утром, дополнительно принимают 1 капсулу препарата перед сном.

Детям от 10 до 18 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле препарата 2 раза в день, при хроническом – по 1 капсуле в день.

Продолжительность лечения зависит от степени выраженности симптомов заболевания и определяется лечащим врачом.

**Побочные действия:**

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, отек лица, спазм бронхов), одышка, тахикардия, сухость во рту, боли в желудке, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре.

При появлении после приема препарата побочных явлений, не указанных в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

**Передозировка:**

При случайной передозировке возможны тошнота, рвота, судороги, в тяжелых случаях – кома или нарушение дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Лечение: вазелиновое масло в количестве 3 мл на килограмм массы тела; промывание желудка 5 % раствором бикарбоната натрия (питьевая сода); вентиляция легких кислородом.

**Взаимодействие с другими препаратами:**

Не описано.

**Форма выпуска:**

Капсулы кишечнорастворимые. По 10 капсул в блистер из ламинированной и алюминиевой фольги. По 2 блистера (20 капсул) в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения:**

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

3 года.

Не принимать по истечению срока годности.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Производитель/Адрес претензий по качеству:**

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt (BRD)

Г. Польш-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ

Килер Штрассе 11

25551 Хохенлокштедт (ФРГ)

**Адрес для предъявления претензий:**

ОАО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл.,

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, 25

Тел.: (495) 705-93-80, Факс: (495) 705-93-82

E-mail: krls@krls.ru

<http://www.krls.ru>

224320027/3

POHL BOSKAMP 